

Argumento de um número complexo

CITAÇÃO

Ferreira, M. (2015)

Argumento de um número complexo,

Rev. Ciência Elem., V2(04):079.

doi.org/10.24927/rce2014.079

EDITOR

José Ferreira Gomes,
Universidade do Porto

RECEBIDO EM

03 de fevereiro de 2012

ACEITE EM

11 de junho de 2012

PUBLICADO EM

31 de dezembro de 2014

COPYRIGHT

© Casa das Ciências 2014.

Este artigo é de acesso livre, distribuído sob licença Creative Commons com a designação [CC-BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), que permite a utilização e a partilha para fins não comerciais, desde que citado o autor e a fonte original do artigo.

rce.casadasciencias.org




Miguel Ferreira

FC/ Universidade de Lisboa

Argumento de um número complexo não nulo, $z = x + iy$, com x, y números reais não simultaneamente nulos, é qualquer número real θ tal que $\cos\theta = \frac{x}{|z|}$ e $\sin\theta = \frac{y}{|z|}$, onde $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ é o módulo do número complexo z .

Escreve-se habitualmente $\theta = \arg(z)$.

Geometricamente:



Onde θ é a amplitude do ângulo, medida em radianos, de vértice na origem, O , cujo lado origem é o semi-eixo real positivo e o lado extremidade é a semi-reta \vec{OP} em que P é o afíxode z .

Nota

Decorre da definição anterior que para cada número complexo z não existe um argumento univocamente determinado pois, se $\theta = \arg(z)$, também, $\theta + 2k\pi = \arg(z)$ para qualquer número inteiro k .

O número complexo $z=0$ tem argumento indeterminado, pois qualquer número real θ pode ser um argumento para $z=0$.

Exemplo

O complexo $z=1-i$, tem por exemplo, os argumentos $\theta_1 = \frac{7\pi}{4}$, $\theta_2 = -\frac{\pi}{4}$, $\theta_3 = \frac{15\pi}{4}$, ou genericamente $\theta = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi$, onde k é qualquer número inteiro.

Geometricamente:

